

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Marburg
Direktor: Professor Dr. med. W. Schmid

THESIS

MARBURG

1968

**Versuche über die Nitro-Reduktion
am Chloramphenicolmolekül durch die Rattenleber**

INAUGURAL - DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades
der gesamten Medizin der Hohen Medizinischen Fakultät
der Philipps - Universität zu Marburg

vorgelegt von

Peter Siebold

aus Ziegenhain

Marburg 1968

Versuche über die Nitro-Reduktion am Chloramphenicolmolekül durch die Rattenleber

INAUGURAL - DISSERTATION
zur Erlangung des Doktorgrades
der gesamten Medizin der Hohen Medizinischen Fakultät
der Philipps - Universität zu Marburg

vorgelegt von

Peter Siebold

aus Ziegenhain

Marburg 1968

Angenommen von der Medizinischen Fakultät
der Philipps-Universität Marburg am 29. 2. 1968

gedruckt mit Genehmigung der Fakultät

Dekan: Prof. Dr.med. R. Siegert

Referent: Prof. Dr.med. W. Schmid

Correferent: Prof. Dr.med. G.W. Löhr

INHALT

	Seite
A. EINLEITUNG	5
B. VERSUCHSMETHODEN	7
1. Gewinnung und Verarbeitung von Rattenharn	7
2. Verarbeitung von Menschenharn	7
3. Inkubation in der Warburg'schen Apparatur	7
a) unter O_2 -Begasung	7
b) unter N_2 -Begasung	8
4. Gewinnung und Inkubation von Mikrosomen	9
5. Dünnschichtchromatographie	10
6. Nachweis getrennter Substanzen unter UV-Licht und colorimetrische Darstellung funktioneller Gruppen	10
a) Betrachtung unter UV-Licht	10
b) Darstellung aromatischer NO_2 -Gruppen	11
c) Darstellung aromatischer NH_2 -Gruppen	11
d) Nachweis von Glucuroniden mit Anilinphthalat	11
e) Darstellung aromatischer Amino- und aroma= tischer Nitrosogruppen in vitro in analoger Weise zur Methode nach Kiese und Herr	12
f) Darstellung aromatischer Amino- und aroma= tischer Nitrosogruppen mit Fearrons Reagenz	12
7. Säulenchromatographie und Sammeln mit dem Fraktionssammler	13
8. Nachweis von Chlorid in eluierten Kieselgel= fraktionen	13
9. Acetylierung von aromatischen Aminen	14

C. VERSUCHSERGEBNISSE	15
1. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten aus Rattenharn	15
2. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten aus Menschenharn	16
3. Vergleich der Rf-Werte der aus Menschen- und Rattenharn isolierten Verbindungen	16
4. Säulenchromatographische Sammlung der dünn= schichtchromatographisch gefundenen Chlor= amphenicolabbauprodukte aus dem Menschenharn	17
5. Ergebnis der Mikrosomeninkubation	17
6. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten durch Inkubation mit Schnitten von Rattenleber	18
a) unter O ₂ -Begasung	18
b) unter N ₂ -Begasung	20
7. Vergleich der Rf-Werte der im Rattenharn (C1) und der durch Inkubation unter O ₂ -Begasung gefundenen Verbindungen	22
8. Vergleich der durch Inkubation bei O ₂ - und N ₂ -Begasung gefundenen Chloramphenicolabbau= produkte	24
D. DISKUSSION	24
E. ZUSAMMENFASSUNG	26
F. LITERATURVERZEICHNIS	27

A. EINLEITUNG

Das Antibioticum Chloramphenicol fällt durch seine besondere chemische Konstitution auf. Es enthält die für ein Naturprodukt außerordentlich seltene Nitrogruppe; und auch das Vorhandensein der Dichloressigsäure ist ungewöhnlich.

Obwohl aromatische Nitroverbindungen wegen ihrer Methämoglobin-bildung durch eine hohe akute Giftigkeit gekennzeichnet sind und außerdem bei chronischer Anwendung eine Schädigung des hämatopoetischen Systems zur Folge haben, besitzt Chloramphenicol im Vergleich dazu eine außerordentlich große therapeutische Breite.

Immerhin ist auch beim Chloramphenicol das Bild der Agranulozytose relativ häufig anzutreffen. Ob man diese mit der Nitrophenylgruppe in Zusammenhang bringen darf, ist fraglich.

Eine Besonderheit finden wir beim Neugeborenen (Lit.14). Hier kommt es bei zu hoher Dosierung in einem großen Prozentsatz zu einer tödlichen Vergiftung. Diese wird darauf zurückgeführt, daß wegen der geringen Aktivität der Glucuronidtransferase das Chloramphenicol nicht gekoppelt und damit auch nicht entgiftet werden kann.

Weiterhin sind bei Säuglingen und Kleinkindern Vergiftungsfälle bekannt, bei denen therapeutische Chloramphenicoldosen zusammen mit anderen Medikamenten gegeben worden waren (Lit. 16). Wenn diese Fälle im einzelnen auch nicht geklärt werden konnten, so kann doch vermutet werden, daß hier eine in den letzten Jahren mehrfach beobachtete Wirkung des Chloramphenicols eine Rolle spielt, nämlich die Hemmung mikrosomaler Umbauvorgänge in der Leber (Lit.19). Diese Wirkung ist zum mindesten beim Tier vorhanden. Vorausgegangene Untersuchungen von KRUG und JEHN hatten nämlich ergeben, daß der Abbau von Hexobarbital schon durch Dosen gehemmt wird, die - auf den Menschen bezogen - im therapeutischen Bereich liegen (Lit.18). So lag die unterste Dosis bei der Maus bei 5 mg/kg. In parallel laufenden Versuchen war für das Ganztier gezeigt worden, daß die Beeinflussung der Lebermikrosomen nur durch das Ge-

santmolekül hervorgerufen wird und daß auf jeden Fall die Entfernung der Dichloressigsäure den Effekt aufhebt.

Chloramphenicol wird in der Leber zum größten Teil an Glucuronsäure gekoppelt - wobei die Nitrogruppe intakt bleibt - und entgiftet. Ein gewisser Anteil, der von Tierart zu Tierart schwankt, wird zur Aminogruppe reduziert (Lit.1,7). Es ist nun zu vermuten, daß gerade bei der Reduktion des Chloramphenicols wirksame Zwischenstufen wie etwa Nitroso- oder Hydroxylaminverbindungen verantwortlich für die Hemmung mikrosomaler Fermente sind, möglicherweise in Analogie zum Abbau des Anilins. Bei diesem entstehen als Oxydationsstufen das Nitrosobenzol bzw. Hydroxylamin und führen in einem Kreisprozeß die Met-Hb-Bildung in den Erythrozyten herbei (Lit.13). Versuche am Ganztier haben allerdings keine Beweise für den Kreisprozeß erbracht; immerhin wurde das Nitrosobenzol gefunden (Lit. 11,12). Außerdem konnte bei der Reduktion des Nitrosobenzols neben Nitrosobenzol eine Aminoverbindung nachgewiesen werden (Lit.10,11).

Um eindeutige Verhältnisse zu schaffen, wurden in der vorliegenden Arbeit Leberschnitte von Ratten verwendet. An ihnen wurde die Möglichkeit eines reduktiven Abbaus des Chloramphenicols unter verschiedenen Versuchsbedingungen geprüft.

B. VERSUCHSMETHODEN UND BEGRÜNDUNG IHRER ANWENDUNG

1. Gewinnung und Verarbeitung von Rattenharn

Weiblichen Ratten mit einem Gewicht von ca. 160 g wurde intramusculär (Nackenfalte) eine Dosis von 25 mg, entsprechend 150 mg/kg Chloramphenicolsuccinat^{*)} injiziert. Anschließend wurde der Harn 24 Stunden in einem Trichter gesammelt, mit 15 ml Essigester ausgeschüttelt und bei Raumtemperatur im Rotationsverdampfer Büchi zu etwa 2 ml eingeeengt.

2. Verarbeitung von Menschenharn

Menschenharn von Patienten, die sich wegen eines Infektes der ableitenden Harnwege einer Chloramphenicoltherapie unterziehen mußten, wurde bei 20° - 30°C im Rotationsverdampfer bis zur Trübung konzentriert und bei 2700 U./min zentrifugiert. Der klare Überstand wurde mit der gleichen Menge Essigester ausgeschüttelt und bei 20° - 30°C im Rotationsverdampfer zu wenigen ml eingeeengt.

3. Inkubation in der Warburg'schen Apparatur

a) unter O₂-Begasung

Weibliche Albinoratten mit einem Gewicht von ca. 160 g wurden durch Genickschlag getötet, innerhalb von 30 - 60 sec wurde die Leber herauspräpariert und in 0°C vorgekühlte Tyrode gelegt. Dann wurde die Leber möglichst rasch in etwa 200 µ dicke Scheiben geschnitten und jeweils 500 mg in eine vorbereitete Inkubationsgefäß gebracht, das ebenfalls in Eiswasser vorgekühlt war.

Ein Inkubationsgefäß enthielt als "Vollwert":

- 7,5 ml Phosphat-Tyrode pH 7,4 gepuffert,
- 500 mg Leberschnitte,
- 1000 µ Chloramphenicolsuccinat,

^{*)} Chloramphenicol wurde uns als Leukomycin^R freundlicherweise von der Firma Bayer zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig wurden Inkubationsgefäße als Leerwerte vorbereitet:

7,5 ml Phosphat-Tyrode pH 7,4 gepuffert

1000 γ Chloramphenicolsuccinat

und

7,5 ml Phosphat-Tyrode pH 7,4 gepuffert

500 mg Leberschnitten.

Die Menge von 1000 γ Chloramphenicol für 500mg Leberschnitten wurde aus folgenden Überlegungen gewählt: Beim Menschen mit etwa 5000 ml Blut und 1500 g Lebergewicht beträgt die therapeutische Dosis 1,0 - 2,0 g Chloramphenicol/Tag. Eine Ratte von 160 g hat etwa 32 ml Blut und eine 7 g schwere Leber. Umgerechnet entspräche also die therapeutische Dosis bei der Ratte 6,5 mg Chloramphenicol/Tag. Umgerechnet auf 500 mg Leberschnitte sind das 930 γ - 1860 γ Chloramphenicol. Als optimal erwies sich 1000 γ Chloramphenicol/500 mg Leberschnitte.

Der Ansatz wurde bei 37°C mit einer O₂-CO₂ (95%-5%)-Begasung geschüttelt. Die O₂-CO₂-Begasung wählten wir deshalb, weil hierbei ein Eindringen des O₂ in die Leberschnitten bis beiderseits 200 μ gewährleistet ist, während bei dem Partialdruck der Luft der Sauerstoff nur 50 μ beiderseits eindringt (Lit.24).

Nach 30 min wurde die Inkubation gestoppt und der Inhalt der Gefäße sofort mit jeweils 20 ml Essigsäureäthylester 3 x ausgeschüttelt. Nach jedem Ausschütteln wurden die Phasen bei 2700 U/min zentrifugiert und der Essigesterüberstand abgehoben. Die so erhaltene Essigesterphase wurde dann bei Raumtemperatur im Rotationsverdampfer zu etwa 2 ml eingengt und mittels Kapillaren auf DC-Platten aufgetragen (s.u.).

b) unter N₂-Begasung

WESTFALL (Lit.20) berichtet, daß Trinitrotoluol durch Kanimchenleber in vitro umgesetzt wird und hierbei eine diazotierbare Substanz auftritt; dieser Reduktionsvorgang verläuft anaerob schneller und sicherer als bei Luftzufuhr.

Auch HONDA und OTSUKA (Lit.9) maßen die Reduktion von p-Nitrophenol in Leberhomogenaten von Ratten, wobei sie fanden,

daß die Reduktion anaerob höhere Ausbeuten ergab als unter aeroben Versuchsbedingungen.

Schließlich konnten HAAN, KIESE und WERNER (Lit.10) in vitro Nitrosobenzol über Phenylhydroxylamin zu Anilin reduzieren. Auch diese Reaktion verlief anaerob sehr viel schneller als bei Anwesenheit von O_2 . Dabei zeigte sich auch, daß die Reduktion zu Anilin unter N_2 -Begasung auch bei Anwesenheit kleiner Mengen Sauerstoff nur wenig beeinflußt wurde, unter CO_2 -Begasung jedoch verzögert verlief.

Wir inkubierten deshalb in einer weiteren Versuchsreihe wieder wie oben beschrieben, doch wurde diesmal die Sauerstoffzufuhr durch eine N_2 -Begasung ersetzt.

Die Inkubationszeiten betrugen: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 60 Minuten (Lit.13), anschließend wurden die Versuche durch sofortiges Ausschütteln mit 10 ml Essigester gestoppt.

4. Gewinnung und Inkubation von Mikrosomen aus Rattenleber

Die Präparation wurde bei $0^\circ C$ ausgeführt, um die Leberzellstrukturen zu erhalten.

5 weibliche Ratten wurden durch Genickschlag getötet, die Leber sofort herauspräpariert und homogenisiert. Dabei wurden 6 g Leber und 30 ml Sacharoselösung 0,25 molar in einem Teflonpotter zerkleinert. Aus dem so gewonnenen Homogenat wurden die Mikrosomen, wie aus folgendem Schema ersichtlich, abzentrifugiert.

Homogenat

10 min bei 600 g = 2300 U./min
zentrifugiert (Christzentrifuge)

Niederschlag:
Kerne

Überstand:
20 min bei 10000 g
= 10 000 U./min

Niederschlag:
Mitochondrien

Überstand:
60 min bei 100 000 g
= 30 000 U./min

Niederschlag:
Mikrosomen

Überstand:
Plasma

Die gesamte erhaltene Mikrosomenfraktion wurde bei 37°C mit Chloramphenicol inkubiert, ausgeschüttelt, eingeengt (Methode B3a) und auf DC-Platten (s. unter 5.) aufgetragen.

5. Dünnschichtchromatographie

Die bisher verwandten Papierchromatographiemethoden sind relativ aufwendig und beanspruchen viel Zeit. Der Vorteil der Dünnschichtchromatographie liegt in der einfachen Versuchsanordnung, in der kurzen Trennzeit und dem guten Trenneffekt (Lit.22).

In unseren Versuchen wurden die zu trennenden Substanzen auf 20 x 20 cm Platten in aufsteigender Methode entwickelt.

Sorptionsmittel war Kieselgel GF₂₅₄ der Firma Merck mit einer Schichtdicke von 0,25 mm. Die Desaga-Trennkammer (21 x 21 x 9) schloß luftdicht. Die Kammersättigung wurde erhalten durch Auskleidung der Kammer mit Filtrierpapier, das mit dem Fließmittel befeuchtet wurde. Ein methodisch langwieriges Problem ergab sich bei der Suche nach einem geeigneten Fließmittel, um einen guten Trenneffekt der noch nicht identifizierten Substanzen zu erzielen. Erprobt wurden die auf Seite 29, 30 und 31 aufgeführten Fließmittel. Als bestes erwies sich dabei eine Mischung aus Chloroform 6 / Isobutanol 20 / Isopropanol 20 / Methanol 2,0, wobei eine exakte Trennung der in der Essigesterphase gelösten Chloramphenicolmetaboliten erzielt wurde. Die Laufstrecke betrug 10 bzw. 15 cm.

6. Nachweis getrennter Substanzen unter UV-Licht und colorimetrische Darstellung funktioneller Gruppen

a) Betrachtung unter UV-Licht

Die entwickelten Platten wurden zuerst bei UV-Licht mit einer Wellenlänge von 254 nm betrachtet. Die auf der Kieselgel GF₂₅₄-Platte vorhandenen Substanzen stellten sich dabei infolge Lichtabsorption als dunkle Flecken dar. Durch Vergleich der Vollwerte mit den Leerwerten konnte der R_f-Wert von Abbauprodukten des Chloramphenicols ermittelt werden.

Die Betrachtung der Platten unter UV-Licht und das Auftre-

ten von Flecken ist jedoch kein absoluter Beweis für die Lage aller Verbindungen, die sich auf der Platte befinden. Die Mehrzahl der Substanzen stellt sich zwar durch Lichtabsorption dar, so daß die Fließmittelfront und der genaue Weg der gelau= fenen Substanzen bestimmt oder bestätigt werden kann. Anschlie= Bend mußte aber noch die colorimetrische Darstellung einzelner funktioneller Gruppen durch Bildung gefärbter Derivate folgen.

b) Darstellung aromatischer NO_2 -Gruppen und ihrer Reduktions= produkte

Die Anwesenheit und die Lage der Nitroverbindungen auf der Platte wird durch Bildung gefärbter Derivate gezeigt (Lit.3):

Zur Reduktion der Nitrogruppen wird mit einem feinen Zer= stäuber ein 15%iges Titanchloridreagenz verdünnt mit einer 1N-HCl-Lösung im Verhältnis 1:10 auf die Platte gesprüht. Noch feucht wird die Platte in einem Glasgefäß Bromdämpfen ausge= setzt, die das überschüssige Titanchlorid oxydieren und somit der nachfolgenden Reaktion entziehen. Die Behandlung mit Brom scheint auf die reduzierten Verbindungen direkt einzuwirken. So ist die karminrote Farbe, die nach dieser Behandlung auf= tritt, eine ganz andere als die Amethystfärbung nach der Be= handlung ohne Bromierung. Die Platte wird dann in einem Abzug gelüftet, um das überschüssige Brom zu entfernen.

Die inzwischen getrocknete Platte wird mit einer Mischung von 10 Teilen Butylnitrit, 5 Teilen n-Butanol und einem Teil Eisessig besprüht. Nach weiteren 2 Minuten wird die Platte mit einer Lösung von 0,1 % N-(1-naphthyl)äthylendiamindihydrochlo= rid in 95 ml n-Butanol und 5 ml 2 N-HCl besprüht. Eine Rosafär= bung zeigt die Anwesenheit von aromatischen NO_2 - NH_2 -Gruppen an.

c) Die Anwesenheit aromatischer Amine wird direkt nachgewie= sen durch Bepsrühen der entwickelten Platte mit Butylnitrit und Kupplungsreagenz, wobei jedoch jetzt Reduktion und Bromie= rung ausgelassen werden.

d) Nachweis von Glucuroniden mit Anilinphthalat

Da zu erwarten ist, daß in der Leber Chloramphenicol durch

Kupplung mit Glucuronsäure entgiftet wird, versuchten wir diese Glucuronide mit Anilinphthalt nachzuweisen. Dabei wurden die Platten mit Anilinphthalat besprüht, 15 min bei 105°C im Trockenschrank gehalten und anschließend unter UV-Licht betrachtet.

Bei Anwesenheit von Uronsäure gibt der Fleck eine jeweils charakteristische Fluoreszenz.

- e) Darstellung aromatischer Amino- und aromatischer Nitroso=gruppen in vitro in analoger Weise zur Methode nach KIESE und HERR (Lit.11)

Die Inkubationsversuche (B3) wurden nach 2, 5, 7, 10, 20, 30 min unterbrochen, sodann wurde die Inkubationsmischung mit 6 ml Tetrachlorkohlenstoff 10 min auf der Schüttelbank geschüttelt, 10 min lang bei 5000 U./min zentrifugiert, die H₂O-Phase abgehoben, der Tetrachlorkohlenstoff mit 2 ml Eisessig und 0,1 ml 20%iger Natriumnitritlösung versetzt und im Verlauf von 15 min 3 mal kräftig durchgeschüttelt, die überschüssige salpetrige Säure mit 0,2 ml 50%iger Ammoniumsulfamatlösung zersetzt und die Ansätze mehrmals kräftig durchgeschüttelt, 10 min stehen gelassen, 3 Tropfen 0,5%ige N-Naphthylaethyldiammoniumdichloridlösung zugesetzt, kurz durchgeschüttelt und der Extrakt 2 Stunden im Dunkeln gehalten.

Der Azofarbstoff befand sich in dem von Tetrachlorkohlenstoff getrennten Gemisch von Eisessig und Wasser.

- f) Darstellung aromatischer Amino- und aromatischer Nitroso=gruppen mit Fearrons Reagenz

S. OTSUKA (Lit.15) war es gelungen, nach der Methode von F. FEIGL (Lit.23) einen colorimetrischen Nachweis von Nitrosobenzol mit Fearrons Reagenz zu erbringen. Nitrosobenzol war in diesen Versuchen das Abbauprodukt des Nitrobenzols durch Schweineleberhomogenat. Entsprechend besprühten wir die im

Fließmittel gelaufenen und im Vakuum getrocknete Platte mit einer Lösung von

15 ml Ferrons Reagenz

5 ml 20%iger NaOH

1 Tropfen 30%igem Perhydrol.

7. Säulenchromatographie und Sammeln mit dem Fraktionssammler

Die Methode der Säulenchromatographie gestattet es, größere Substanzmengen zu trennen.

Wir verwendeten dabei eine Säule von 50 cm Länge und einem Durchmesser von 2,5 cm. Als Sorptionsmittel benutzten wir Kieselgel der Firma Merck mit einer Korngröße von 0,08 - 0,2 mm. Die Säule wurde mit dem Kieselgel, das in dem Fließmittel Chloroform 60 / Isobutanol 20 / Isopropanol 20 / Methanol 2 aufgeschwemmt war, gefüllt.

Der im Verdampfer eingeeengte Essigesterauszug wurde an das Kieselgel adsorbiert und dieses trockenpulvrig mit einer Schichtdicke von ca. 1 cm auf die Säule aufgetragen.

8. Nachweis von Chlorid in eluierten Kieselgelfractionen

Der Nachweis von Chlorid aus der Dichloroacetogruppe in den getrennten Verbindungen wurde in vitro durch Niederschlag von Silberchlorid geführt (Lit.21). Dabei mußte ein Oxydationsmittel gefunden werden, dessen Oxydationspotential ausreichte, um aus Chloramphenicol bzw. den getrennten Verbindungen organisch gebundenes Chlor in Chlorid zu überführen, das hingegen nicht Silberionen zu metallischem Silber oxydierte. Als optimal erwies sich Ammoniumperoxodisulfat.

So wurde das Essigesterkonzentrat eines Inkubationsversuches (B3) dünn-schicht-chromatographisch getrennt, die unter UV-Licht lokalisierten Flecke der Chloramphenicol-abbauprodukte von der Kieselgelplatte abgeschabt, das Kieselgel in Chloramphenicol ausgeschüttelt, dem Chloroformauszug 2 ml aqua dest. zugesetzt und das Chloroform im Umlaufverdampfer bei Zimmertemperatur abgedampft. Die

so gewonnene H_2O -Phase enthielt jetzt die Chloramphenicolabbauprodukte und wurde mit 1 ml Ammoniumperoxydisulfat und 2 Tropfen Silbernitrat versetzt.

Bei Anwesenheit von Chlorid fiel nach Stehen über Nacht ein weißer $AgCl$ -Niederschlag aus, der sich mit NH_3 versetzt zu Silberdiammonium-Chlorid löste und unter dem Mikroskop charakteristische Tetraederform-Kristalle zeigte.

9. Acetylierung von aromatischen Aminen

Die Acetylierung der bis zum Amin reduzierten Chloramphenicolmetabolite erfolgte, um diese von der Diazotierung und anschließender Kupplung auszuschließen und zur Unterscheidung aromatischer Amine von noch vorhandenen paraständig reduzierten aromatischen Nitroverbindungen.

Dazu wurden

7,5 ml Pyridin,

2,5 ml Essigsäureanhydrid und das

Essigesterkonzentrat eines Inkubationsversuches

30 min bei $80^{\circ}C$ im Wasserbad gehalten.

Anschließend wurde das Reaktionsgemisch bei $120^{\circ}C$ Badetemperatur im Vakuum auf 1 ml eingengt und dünnschichtchromatographisch getrennt.

C. VERSUCHSERGEBNISSE

1. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten aus Rattenharn

GLAZKO, DILL und WOLF (Lit.6) hatten bereits gefunden, daß bei kleineren Tieren wie Ratten und Meerschweinchen die aromatische Nitrogruppe des Chloramphenicols durch Gewebsenzyme zu aromatischen Aminen reduziert werden kann.

Uns interessierte, welche Chloramphenicolmetabolite nach intramuskulärer Injektion von Chloramphenicol im Harn von Ratten erscheinen und ob die in der Leber enzymatisch abgebauten Chloramphenicolderivate sich aus dem Harn dünn-schichtchromatographisch isolieren lassen. So wurde das Essigesterkonzentrat des Harns von Ratten, denen Chloramphenicol injiziert worden war, dünn-schichtchromatographisch entwickelt.

Dabei fanden wir regelmäßig (s. Abb. 1):

- a) einen aromatischen Nitrokörper Rf-Wert 0,73, der durch Parallelchromatogramme als Chloramphenicol identifiziert wurde,
- b) eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,55,
- c) eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,36,
- d) eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,24.

Die Verbindungen b, c, d ließen sich colorimetrisch darstellen und die Anwesenheit aromatischer Nitrogruppen beweisen.

- e) Regelmäßig bildeten sich vom Startpunkt bis zum Rf-Wert 0,18 ein Schwanz auf der Platte, der sich ebenfalls colorimetrisch darstellen ließ, in dem sich aber nur aromatische Nitroverbindungen befanden.

Als Kontrollwerte liefen Essigsterauszüge von Rattenharn ohne Chloramphenicolinjektion, bei denen keine aromatischen Nitrogruppen gefunden wurden.

Bei der Behandlung mit Anilinphthalat ließen sich aus den Essigsterauszügen des Rattenharns keine Uronsäureverbindungen darstellen.

2. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten aus Menschenharn

Nach GLAZKO, DILL und WOLF und BRATTON (Lit.1,6) bestehen signifikante Unterschiede beim Chloramphenicolabbau kleiner Tiere wie Ratten und Meerschweinchen und dem Abbau des Chloramphenicols beim Menschen. Deshalb sammelten wir Menschenharn von Patienten, die sich einer Behandlung mit Chloramphenicol unterzogen hatten, verarbeiteten diesen (B2) und entwickelten die Abbauprodukte wie bei den obigen Versuchen. Außer Chloramphenicol erhielten die Patienten die Medikamente Nyxanthan^R, Digitoxin^R und Effortil^R, die aber unseren Versuch nicht beeinflussten, da diese Präparate keine aromatischen NO₂- oder NH₂-Gruppen enthalten.

Dabei fanden wir regelmäßig (s. Abb. 1):

- a) eine Verbindung Rf-Wert = 0,73, die durch Parallelschromatogramme als Chloramphenicol identifiziert wurde,
- b) eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,71,
- c) eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,36.

Die Verbindungen a, b und c enthalten aromatische NO₂-Gruppen.

- d) Im Rf-Bereich vom Startpunkt bis 0,15 bildet sich ein Schwanz auf der Platte, in dem weitere NO₂-Verbindungen gelagert sind.

3. Vergleich der Rf-Werte der aus Menschen- und Rattenharn isolierten Verbindungen

Obwohl bedeutende Unterschiede beim Chloramphenicolabbau zwischen Menschen und Tieren bestehen, interessierte uns, ob die aus dem Menschen- und Rattenharn in Essigester ausgeschüttelten und isolierten Verbindungen identisch sind. Ein Vergleichsschromatogramm mit Essigesterauszügen aus Menschen- und Rattenharn ergab, daß die Flecken a und c des Menschenharns den Flecken a und c des Rattenharns entsprachen (s. Abb. 1). Fleck b des Menschenharns konnte im Essigesterauszug des Rattenharns nicht wiedergefunden werden.

4. Säulenchromatographische Sammlung der dünnschichtchromatographisch gefundenen Abbauprodukte aus dem Menschenharn

Nach der dünnschichtchromatographischen Trennung von Chloramphenicolmetaboliten aus Menschenharn versuchten wir, durch Spektralanalyse eine weitere Strukturaufklärung der im Menschenharn isolierten NO_2 -haltigen Chloramphenicoläquivalente zu erzielen. Da die dünnschichtchromatographisch getrennten Substanzen nur wenige μg betragen, zu einer Analyse jedoch eine Mindestmenge von ca. 50 mg notwendig ist, sammelten wir größere Mengen von Menschenharn. 4 l Harn eines Patienten, der 3 Tage lang 1 g Chl./Tag appliziert bekommen hatte, schüttelten wir mit Essigester aus und engten die Essigesterphase auf wenige ml ein (B2). Danach isolierten wir die im Essigester auszug vorhandenen Substanzen durch die Säulenchromatographie (B7).

Durch dünnschichtchromatographische Rechromatographie der einzelnen Portionen des Fraktionssammlers konnten wir die Flecken a, b und c bestätigen (s. Abb. 2).

Außerdem fand sich vermutlich aufgrund der bedeutend längeren Laufstrecke und durch die erheblich größere Substanzmenge ein Fleck o mit einem R_f -Wert von 0,86, der ebenfalls ein nitrophenylhaltiges Chloramphenicolabbauprodukt enthalten mußte, wie colorimetrisch gezeigt werden konnte ($B6_{b,c}$).

Die dünnschichtchromatographisch als Schwanz erscheinenden NO_2 -Körper ließen sich säulenchromatographisch in weitere Flecken d und e auftrennen, machten aber mengenmäßig nur einen kleinen Teil der gesamten Abbauprodukte aus.

Das säulenchromatographisch aus 4 l Menschenharn gewonnene Substrat wurde jetzt im Rotationsverdampfer rein dargestellt, indem wir das gesamte Fließmittel abdampften.

Das so erhaltene Reinsubstrat jedoch reichte mengenmäßig nicht aus, um eine Spektralanalyse durchführen zu lassen.

5. Ergebnis der Mikrosomeninkubation

Da der Chloramphenicolabbau bzw. die -entgiftung in den Leberzellmikrosomen stattfindet (Lit.19), inkubierten wir die

nach B4 gewonnenen Mikrosomen mit 1000 μ Chloramphenicol wie in B3 beschrieben.

Dünnschichtchromatographisch jedoch konnten wir eine Trennung mit dem erprobten Fließmittel Chloroform 60 / iso-Butanol 20 / iso-Propanol 20 / Methanol 2,0 nicht erzielen. Außerdem wanderten TPNH und Nicotinsäureamid als Fleckenkonglomerat in einem Rf-Bereich von 0,08 - 0,45 und hätten somit eine eventuell vorhandene Nitrosoverbindung vollständig überlagert.

Das unveränderte Chloramphenicol stellte sich bei diesem Versuch mit einem Rf-Wert von 0,73 deutlich dar (s. Abb. 3).

6. Isolierung von Chloramphenicolabbauprodukten durch Inkubation mit Schnitten von Rattenleber

a) unter O₂-Begasung

Bereits von SMITH und WORREL (Lit.8) wurden biochemische Studien über den Abbau von Chloramphenicol durch Mikroorganismen angestellt.

GLAZKO, DILL und WOLF (Lit.5,6), REBER und LICHTENBERG (Lit.7) gelang der papierchromatographische Nachweis von Abbauprodukten des Chloramphenicols in Ratten- und Menschenharn und die Identifikation der Abbauprodukte. Dabei wiesen sie darauf hin, daß Darmbakterien eine wesentliche Rolle bei der Chloramphenicolreduktion zukommt.

Uns interessierte, welche Rolle die Leber beim Chloramphenicolabbau und speziell der Reduktion aromatischer NO₂-Gruppen spielt, und wir versuchten, eventuelle Reduktionsprodukte dünn-schichtchromatographisch darzustellen.

Wir inkubierten also Chloramphenicol nach der in B3a beschriebenen Methode. Dünnschichtchromatographisch konnten wir 3 Verbindungen isolieren, die durch enzymatischen Abbau des Chloramphenicols entstanden sein mußten.

Die Metabolite erschienen nur bei den Chloramphenicol-Leberwerten (Chl.-L.), nicht bei den zur Kontrolle mitgelaufenen Leberwerten (L.) ohne Chloramphenicol.

Regelmäßig (s. Abb. 3 und 4)

a) fand sich ein Nitrokörper mit einem Rf-Wert = 0,73 (s. Harn). Durch Parallelchromatogramme, bei denen Chlor=

amphenicol als Vergleichswert lief, wurde diese Substanz als Chloramphenicol identifiziert,

b) wurde eine Verbindung mit dem Rf-Wert = 0,36 nachgewiesen, das Vorhandensein einer Nitrophenylgruppe wurde colorimetrisch bewiesen,

c) konnte eine Verbindung mit einem Rf-Wert von 0,27 unter UV-Licht und colorimetrisch dargestellt werden. Diese Verbindung muß eine aromatische Nitrosogruppe enthalten, wie sich nach B6_{b,c,f} zeigen läßt:

Dieser Chloramphenicolmetabolit ließ sich zwar nach vorheriger Reduktion durch Behandlung mit Butylnitrit und Kupplungsreagenz karminrot darstellen, eine Färbung ohne Reduktion bei alleiniger Kupplung gelang jedoch nicht.

Bei Besprühen mit Fearrons Reagenz erzielten wir den Versuchen OTSUKAs entsprechend eine die Nitrosogruppe beweisende Gelbfärbung.

Das Molekül enthielt kein Chlorid, wie der negative Ausfall der Chloridnachweisreaktion (B8) zeigte. Diese Tatsache und der niedrige Rf-Wert bei dem verwendeten System lassen vermuten, daß der Dichloressigsäurerest aus dem Molekül bereits hydrolytisch abgespalten ist.

Die zur dünnschichtchromatographischen Darstellung benötigte Auftropfmenge des Essigesterkonzentrates war hier wesentlich größer, als sie zur Darstellung von Fleck a genügte. In Parallelversuchen konnten noch 5 µg Chloramphenicol colorimetrisch dargestellt werden; man muß also folgern, daß bei der hier angewandten Inkubationsmethode der enzymatische Reduktionsvorgang nur in geringem Ausmaß stattfindet.

Zur Erhöhung der Abbaurate beim Chloramphenicol-Inkubationsversuch injizierten wir den Versuchstieren vor einem Versuch 7 Tage lang 25 mg Chl./die, da wir uns eine Aktivierung oder sogar die Zunahme der zum Abbau benötigten Reduktasen in der Rattenleber erhofften: gleichsam das "Erlernen" der Chloramphenicolreduktion durch die Mikrosomen. Die Verwendung so vorher behandelter Tiere ergab jedoch keine signifikante Abbaubesserung.

Auch die Zugabe von TPNH und Nicotinsäureamid verbesserten das bisherige Versuchsergebnis nicht.

b) unter N_2 -Begasung

Der qualitative Nachweis reduzierter Aminophenylgruppen in vitro mit der Methode nach KIESE und HERR (B6e) erlaubt eine Aussage, ob die Nitrophenylgruppe bei unserem Inkubationsversuch reduziert wurde. Durch eine sogenannte "kinetische Reihe", d.h. das Unterbrechen des Versuches nach verschiedenen langen Inkubationszeiten, erhielten wir eine Aussage darüber, nach welchen Inkubationszeiten ein Maximum an reduzierten Chloramphenicolmetaboliten vorlag.

Nach KIESE und HERR wird in den ersten Minuten des Kontakts eines Organismus mit Nitrophenol die größte Konzentration an Nitrosophenol und Aminophenol im Blute gemessen.

Bei einer solchen Versuchsreihe mit Leberschnitten unter N_2 -Begasung konnten wir ein analoges Ergebnis nicht erzielen. Das Intensitätsmaximum des durch Verbindungen mit aromatischen NH_2 -Gruppen gebildeten Azofarbstoffs wurde bei uns nach 20 Minuten erreicht. Eine kürzere oder längere Inkubationszeit dagegen zeigte keine Intensitätszunahme des von aromatischen NH_2 -Gruppen mit Kupplungsreagenz gebildeten Azofarbstoffs, da offensichtlich die Reduktionskraft der vorhandenen Nitroreduktasen beschränkt ist und sich ein Gleichgewicht zwischen aromatischen NO_2 -, NO - und NH_2 -Verbindungen eingestellt hatte.

Bei der Inkubation unter N_2 -Begasung, die ein annähernd O_2 -freies Milieu gewährte, ließen sich dünnschichtchromatographisch folgende Verbindungen trennen, die am aromatischen Ring eine NO_2 -, NO - oder NH_2 -Gruppe enthalten müssen (s. Abb.4 u.5):

- a) Sehr intensiv findet sich eine Verbindung mit dem R_f -Wert = 0,73, die durch Vergleichschromatogramme als Chloramphenicol identifiziert wurde.
- b) Regelmäßig findet sich unter UV-Licht eine Verbindung mit dem R_f -Wert von 0,58, deren Konstitution durch colorimetrische Methoden teilweise dargestellt werden konnte.

Dieser Metabolit enthält eine aromatische Aminogruppe;

die Dichlorogruppe befindet sich nicht mehr im Molekül.

- c) Regelmäßig findet man bei einem Rf-Wert = 0,27 eine Verbindung, die in äußerst schwacher Konzentration vorliegen muß, da sie unter UV-Licht nur einen schwachen Absorptionsfleck erkennen läßt. Durch colorimetrische Methoden läßt sich beweisen, daß das Molekül eine aromatische Nitrosogruppe enthält. Auch bei dieser Verbindung ist die Dichlorogruppe, vermutlich auch die Dichloroacessigsäure, abgespalten.

Zur Strukturaufklärung funktioneller Molekülgruppen wurden die getrennten Verbindungen b und c nach $BG_{b,c,f}$ behandelt:

Beide Chloramphenicolmetabolite wurden nach Reduktion und Diazotierung karminrot dargestellt.

Verbindung b färbte sich bei Diazotierung ohne vorangehende Reduktion intensiv violett. Da aber nur aromatische Amine bei Behandlung mit Butylnitrit und Kupplungsreagenz einen Azofarbstoff bilden, muß hier eine aromatische Aminoverbindung vorliegen.

Beim Acetylierungsversuch wurde diese NH_2 -Gruppe mit einem Acetylrest besetzt und so dem weiteren colorimetrischen Nachweis entzogen.

Verbindung c, die sich nach Reduktion als Azofarbstoff darstellen ließ, zeigte jedoch bei alleiniger Diazotierung ohne vorherige Reduktion keine Färbung.

Bei Besprühen mit Fearrons Reagenz färbte sich dieser Chloramphenicolmetabolit goldgelb.

Er muß also am aromatischen Ring ein N-Atom enthalten, das jedoch nicht in NO_2 - oder NH_2 -Gruppen gebunden sein kann.

Nach SMITH und WORREL (Lit.4,8), GLAZKO, DILL, WOLF und REBSTOCK (Lit.3,5,6) reduziert der Organismus die aromatische NO_2 -Gruppe des Chloramphenicols über die entsprechenden Nitroso- und Hydroxylamingruppen. Eine dieser beiden Gruppen mußte hier vorliegen. Die Hydroxylamingruppe ist jedoch äußerst labil, so daß praktisch nur eine Nitroso-Gruppe im Molekül vorliegen kann. Um ein sehr labiles Hydroxylamin mit letzter Sicherheit auszuschließen und unsere Vermutung weiter zu stützen, acetylierten wir das Essigesterkonzentrat eines Inkubationsversuches nach B9 und

behandelten nach dünnsschichtchromatographischer Trennung die Platte erneut mit Fearrons Reagenz. Dabei fanden wir den Fleck c unverändert wieder (R_f -Wert = 0,27), ebenso blieb die goldgelbe Färbung bei Besprühen mit Fearrons Reagenz.

Der sehr empfindliche Chloridnachweis mit Ammoniumperoxo=disulfat und Silbernitrat ergab, daß die Metabolite b und c kein Chlorid mehr enthalten, da in wiederholten Versu=chen keine Intensitätsänderung der eben angedeuteten Opales=zenz zwischen gleichen Mengen Kieselgel als Nullwert und dem Eluat der Verbindungen b und c sich zeigte. Dagegen zeigten sowohl der Chloramphenicolauszug R_f -Wert = 0,73 als auch 1000 Chloramphenicol als Vergleichswert massive kristalline AgCl-Niederschläge.

7. Vergleich der R_f -Werte der im Rattenharn (C1) und der durch Inkubation unter O_2 -Begasung (C6b) gefundenen Ver=bindungen

Um zu sehen, ob die Chloramphenicolabbauprodukte, die mit O_2 -begaster Inkubation gewonnen wurden, mit den im Rattenharn gefundenen Verbindungen identisch sind, entwickelten wir sie auf einer Platte nebeneinander. Dabei ergab sich, daß die Flecken

Chloramphenicol- Leber (O_2)		Chloramphenicol- Rattenharn
a	$R_f = 0,73$	a
b	$R_f = 0,36$	c

in ihren R_f -Werten übereinstimmten.

Fleck b des Essigester-auszuges und die colorimetrisch färb=bare Schwanzbildung aus Rattenharn konnten bei den Inkubations=versuchen mit Leberschnitten nicht wiedergefunden werden, muß=ten also andere Chloramphenicolmetabolite darstellen.

Immerhin konnten wir zeigen, daß Chloramphenicol in der Le=ber enzymatisch abgebaut wird und daß die dabei entstehenden Metabolite zum Teil unverändert mit dem Harn ausgeschieden werden.

8. Vergleich der durch Inkubation bei O₂- und N₂-Begasung gefundenen Chloramphenicolabbauprodukte

WESTFALL (Lit.20), HONDA und OTSUKA (Lit.9,15) fanden eine Reduktion aromatischer Nitrogruppen unter anaeroben Versuchsbedingungen bis zum aromatischen Amin.

Dabei zeigte sich, daß gewaschene Mikrosomen anaerob nur bei Zusatz von NADPH Nitrophenylgruppen reduzierten.

In unseren Inkubationsversuchen mit Chloramphenicol konnten wir ein entsprechendes Ergebnis erzielen.

Die folgende Tabelle zeigt die isolierten Chloramphenicolmetabolite bei Inkubation unter O₂- und N₂-Begasung:

<u>Chl.-Leber O₂</u>		<u>Chl.-Leber N₂</u>
Chloramphenicol	Rf = 0,73	Chloramphenicol
	Rf = 0,58	zum aromatischen Amin reduzierter Chloramphenicolmetabolit (NH ₂ -)
Chloramphenicolmetabolit mit einer Nitrogruppe	Rf = 0,36	
Chloramphenicolmetabolit mit einer Nitrosogruppe (NO-)	Rf = 0,27	Chloramphenicolmetabolit mit einer Nitrosogruppe (NO-)

Unter anaeroben Verhältnissen also wird bei unseren Inkubationsversuchen Chloramphenicol zum aromatischen Amin reduziert und die Dichloressigsäure vermutlich hydrolytisch vom Molekül abgespalten.

Unter Begasung mit Sauerstoff dagegen verläuft die Reduktion nur bis zur Nitrosogruppe, wobei aber die Dichloressigsäure ebenfalls, vermutlich hydrolytisch, abgespalten wird.

Beide Nitrosometabolite sind identisch, da sie auf Vergleichschromatogrammen gleiche Rf-Werte haben und colorimetrisch ein gleiches Verhalten zeigen.

D. DISKUSSION

Um einen Überblick über die in der Rattenleber zu erwartenden Abbauprodukte des Chloramphenicol zu erhalten, wurden im Urin nach subcutaner Injektion die nicht gekoppelten Abbaustufen bestimmt.

Außerdem wurde ein Vergleich angestellt mit Abbauprodukten des Chloramphenicol aus dem Menschenharn.

Hierbei fanden sich neben dem Chloramphenicol selbst mindestens fünf weitere Metaboliten, die alle die Nitrophenylgruppe besaßen.

Im Hinblick auf die Fragestellung wurden keine Anhaltspunkte gewonnen, daß an der Nitrogruppe reduzierte Metaboliten ausgeschieden werden.

Sehr viel aufschlußreicher verliefen die Versuche an isolierten Leberschnitten, die unter verschiedenen Milieubedingungen mit Chloramphenicol inkubiert wurden:

Bei Inkubation in Sauerstoffatmosphäre fanden sich bei der dünnenschichtchromatographischen Auftrennung in dem von uns verwendeten System Chloroform 60 / iso-Butanol 20 / iso-Propanol 20 / Methanol 2,0 außer Chloramphenicol selbst und einem an der Basis sitzengebliebenen Rest zwei eindeutige Flecken mit einem geringeren Rf-Wert als Chloramphenicol:

Der eine Fleck mit einem Rf-Wert von 0,36 war erst nach Reduktion kupplungsfähig. Er war nicht acetylierbar und ergab mit Fearrons Reagenz auf Nitrosogruppen keine Färbung. Es handelte sich demnach um einen NO_2 -haltigen Metaboliten.

Die zweite Substanz mit dem Rf-Wert = 0,27 färbte sich mit Fearrons Reagenz, war erst nach Reduktion kupplungsfähig und war ebenfalls nicht acetylierbar. Nach diesen Ergebnissen handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Metaboliten mit einer Nitrosogruppe am Phenylsubstituenten. Nach dem niedrigen Rf-Wert war bei dem verwendeten System zu erwarten, daß es sich um einen Metaboliten handelte, bei dem der Dichloressigsäurerest abgespalten war. Diese Annahme wurde dadurch bestätigt, daß in der eluierten Sub-

stanz kein Chlorid mit Ammoniumperoxodisulfat und Silbernitrat nachweisbar war.

Bei Inkubation in Stickstoffatmosphäre dagegen fehlte der Metabolit Rf-Wert = 0,36, während der die Nitrosogruppe enthaltende Chloramphenicolmetabolit unverändert mit dem Rf-Wert = 0,27 wiedergefunden wurde.

Dafür tauchte bei Rf-Wert = 0,58 ein neuer Metabolit auf, der dadurch charakterisiert ist, daß er direkt kuppelbar, nach Acetylierung aber nicht mehr kupplungsfähig ist. Dies spricht für das Vorliegen eines bis zum Amin bzw. Anilin reduzierten Metaboliten. Sowohl dem Rf-Wert nach wie auch der negative Ausfall der Chloridreaktion sprechen dafür, daß bei diesem Metaboliten der Dichloressigsäurerest abgespalten ist.

Die Versuche haben also gezeigt, daß die Nitrophenylgruppe des Chloramphenicols von Leberschnitten der Ratte unter aeroben Verhältnissen zur Nitrosogruppe reduziert wird, während unter anaeroben Bedingungen neben dieser Stufe auch das Amin gebildet wird. Bei beiden Metaboliten ist die Dichloressigsäure schon hydrolytisch abgespalten. Damit ist allerdings noch nicht entschieden, welche Reaktion zuerst erfolgt, die Hydrolyse oder die Reduktion. Wichtig erscheint, daß es sich um nicht gekuppelte und damit biochemisch noch wirksame Metaboliten handelt.

Es ist deshalb die Möglichkeit zu diskutieren, ob bei der Reduktion der Nitrophenylgruppen nicht im Nitrosometaboliten eine Substanz vorliegt, welche mit einer der eisenhaltigen Substanzen der mikrosomalen Reaktionskette in Beziehung tritt. Diese Reaktion könnte die blockierende Wirkung des Chloramphenicols auf mikrosomale Umbaureaktionen in der Leberzelle erklären.

E. ZUSAMMENFASSUNG

1. Im Menschen- und Rattenharn sowie in Schnitten von Rattenleber wurden nicht gekuppelte Metaboliten des Chloramphenicols nachgewiesen.
2. Im Harn fanden sich außer Chloramphenicol selbst fünf nitrophenylsubstituierte Metaboliten, die von uns nicht näher identifiziert wurden.
3. An Leberschnitten wurde sowohl unter aeroben wie anaeroben Bedingungen das Auftreten eines Metaboliten wahrscheinlich gemacht, bei dem es sich um ein Nitrosophenylderivat des Chloramphenicols ohne Dichloressigsäurerest handelt.
4. Es wird vermutet, daß diese Reduktionsprodukte in Zusammenhang mit der Hemmung mikrosomaler Umbauvorgänge der Leber durch Chloramphenicol stehen.

F. LITERATURVERZEICHNIS

- 1) Wolf, L.M., Glazko, A.J., Dill, W.A., Bratton, A.C.:
"Biochemical Studies on Chloramphenicol."
J. Pharmak. exp. Therap. 96, 445 (1949)
- 2) Dill, W.A., Glazko, A.J.:
"Identification of Chloramphenicol Degradation
Products by Paper Chromatography."
Federation Proc. 8, 34 (1949)
- 3) Glazko, A.J., Dill, W.A., Wolf, L.M.:
"A Colorimetric Method for the Determination
of Chloramphenicol; Application to Biological
Studies."
J. of Clin. Invest. 28, 1051 (1949)
- 4) Smith, G.N., Worrel, C.S.:
"The Application of Paper-partition Chromato-
graphy to the Analysis of Chloramphenicol and
its Decomposition Products."
Arch. Biochem. 28, 1 (1950); 28, 232 (1950)
- 5) Glazko, A.J., Dill, W.A., Rebstock, M.C.:
"Isolation and Identification of Metabolic Pro-
ducts in Urine. Biochemical Studies on Chlor-
amphenicol."
J. Biolog. Chem. 183, 679 (1950)
- 6) Glazko, A.J., Dill, W.A., Wolf, L.M.:
"Observation on the Metabolic Disposition of
Chloramphenicol in the Rat."
J. Pharmakol. exp. Therap. 104, 452 (1952)
- 7) Reber, H., Lichterberg, E.:
"Papierchromatographischer Nachweis von Chloram-
phenicol und seinen Abbauprodukten im Urin."
Helvetica medica Acta 20, 396 (1953)
- 8) Smith, G.N., Worrel, C.S.:
"Reducing of Chloramphenicol and Related Com-
pounds by E. coli."
J. Bacteriol. 65, 313 (1953)
- 9) Honda, K., Otsuka, S., Shimoda, Y.:
"Nitroreductase of Mammals Nitro-reducing Capa-
city of the Liver and its Relation to the De-
hydrogenase System."
J. Biochem. (Japan) 43, 387 (1956)
- 10) Haan, J., Kiese, M., Werner, A.:
"Reduktion von Nitrobenzol zu Anilin in roten
Blutkörperchen."
Arch. exp. Pharmak. Path. 235, 356 (1959)

- 11) Kiese, M.: "Bestimmung von Nitrosobenzol im Blute."
Arch. exp. Pharmak. Path. 235, 351 (1959)
- 12) Kiese, M.: "Oxydation von Anilin zu Nitrosobenzol im Hunde."
Arch. exp. Pharmak. Path. 235, 354 (1959)
- 13) Holzer, M., Kiese, M.:
"Bildung von Nitrosobenzol, Anilin und Hämiglobin in Katzen und Hunden nach intravenöser Injektion von N-Alkylanilinen."
Arch. exp. Pharmak. Path. 238, 546 (1960)
- 14) Bredschneider, Stur, Zweymüller:
"Schwere Chloramphenicolnebenwirkungen bei Neugeborenen."
Dtsch. med. Wschr. 33, 1444 (1960)
- 15) Otsuka, S.: "Studies of Nitro-Reducing Enzymes in Swine-Liver."
J. Biochem. (Tokio) 50, 87 (1961)
- 16) Spröggel, E.:
"Über die gegenseitige Beeinflussbarkeit der Entgiftung bei Arzneimittelkombinationen."
Inauguraldissertation (1962)
- 17) Uehleke, H.: "Nitrosobenzol und Phenylhydroxylamin als Zwischenstoffe der biologischen Reduktion von Nitrobenzol."
Naturwissenschaften 50, 335 (1963)
- 18) Krug, A.: "Beeinflussung des Hexobarbitalabbaues durch Chloramphenicol bei der Ratte."
Arch. exp. Pharmak. Path. 246, Heft 1, 58 (1965)
- 19) Uehleke, H.: "Biologische Oxydation und Reduktion am Stickstoff aromatischer Amino- und Nitroderivate und ihre Folgen für den Organismus."
Fortschr.d.Arzneimittelforsch. 8, 195 (1965)
- 20) Westfall, B.B.:
"The Reduction of 2,4,6-Trinitrotoluene by Animal Tissue in vitro."
J. Pharmak. exp. Therap. 78, 386 (1943)
- 21) Gattermann-Wieland:
"Nachweis von Säurechloriden."
Praxis des organischen Chemikers 114
- 22) Stahl, E.: "Dünnschichtchromatographie." (1962)
- 23) Feigl, F.: "Spot Tests."
2, 121 (1956)
- 24) Warburg, O. "Stoffwechsel der Tumoren."
Springer Verlag Berlin (1928)
- 25) Schneider, Hogboom:
"Methoden der Zellfraktionierung."

ERPROBTE FLIESSMITTEL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NH ₃													3			
Pril											3		Tropfen			
Phenol													Tropfen			
Eisessig										3						
n-Butanol													Tropfen			
H ₂ O-gesättigt																
n-Butanol																
iso-Butanol																
H ₂ O																
Pyridin																
Methanol	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	100	100	100			
iso-Propanol																
Aceton																
Essigester													100	50	10	
Diäthyläther																
Chloroform	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Benzol																

[illegible]

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
NH ₃			2%											
Pril														
Phenol				2%										2
Eisessig														
n-Butanol														
H ₂ O-gesättigt		50												
n-Butanol		50	50		20	80	80	10						
iso-Butanol								40	20	20	20	20	20	20
H ₂ O								2						
Pyridin														
Methanol				100	30	5		2,0	2,0	5	1,5	0,5	2,0	
iso-Propanol								20	20	20	20	20	20	
Aceton								10						
Essigester							10							
Diäthyläther				100	50	20	10							
Chloroform	50	50	50					60	60	60	60	60	60	60
Benzol								100						

Abb. 1

Chromatographischer Nachweis von Chloramphenicolabbauprodukten aus Ratten- und Menschenharn sowie nach Inkubation mit Schnitten von Rattenleber unter O_2 -Begasung

Laufmittel: Chloroform/iso-Butanol/iso-Propanol/Methanol
(60 + 20 + 20 + 2,0)

Detektion : $TiCl_3/Br_2$ /Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin

Laufzeit : 30 min




Abb. 2

Rechromatogramm der einzelnen durch die Säulenchromatographie getrennten und im Fraktionssammler gesammelten Portionen (jeweils 5 ml) Essigesterkonzentrates von 4 l Menschenharn nach 3-tägiger Chloramphenicolgabe

Laufmittel: Chloroform/iso-Butanol/iso-Propanol/Methanol
(60 + 20 + 20 + 2,0)

Detektion : $\text{TiCl}_3/\text{Br}_2$ /Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin

Laufzeit : 30 min




Abb. 3

Chromatographischer Nachweis von Chloramphenicolabbauprodukten
nach Inkubation mit Schnitten von Rattenleber unter O_2 -Begasung
und nach Mikrosomeninkubation

Laufmittel: Chloroform/iso-Butanol/iso-Propanol/Methanol
(60 + 20 + 20 + 2,0)

Detektion : $TiCl_3/Br_2$ /Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin

Laufzeit : 30 min




Abb. 4

Chromatographischer Nachweis von Chloramphenicolabbauprodukten
nach Inkubation mit Schnitten von Rattenleber unter O_2 -Begasung
und unter N_2 -Begasung

Laufmittel: Chloroform/iso-Butanol/iso-Propanol/Methanol
(60 + 20 + 20 + 2,0)

Detektion : I. $TiCl_3/Br_2$ /Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin
II. Fearrons Reagenz

Laufzeit : 30 min





Abb. 5

Chromatographischer Nachweis von Chloramphenicolabbauprodukten nach Inkubation mit Schnitten von Rattenleber unter N_2 -Begasung

Laufmittel: Chloroform/iso-Butanol/iso-Propanol/Methanol
(60 + 20 + 20 + 2,0)

Detektion : I. $TiCl_3/Br_2$ /Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin
II. Fearrons Reagenz
III. Butylnitrit/N-Naphthylacetylendiamin


Laufzeit : 30 min




LEBERSCHNITTE (RATTE) incubiert m. Chloramphenicol

DC: Chlorof. - *iso*-Prop. - *iso*-But. - Meth.- anal
60 20 20 2

INCUBATIONS - ATMOSPHÄRE



karmin gelb violett türkis



Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Walter Schmid,
möchte ich für die Anregungen und die freundliche Hilfe
und Anleitung bei der Arbeit danken.

Lebenslauf

Ich, Rolf Peter Siebold, wurde am 12. Oktober 1937 als zweiter Sohn des Arztes Dr.med. Matthias Siebold und seiner Ehefrau Eleonore, geb. von Ditzfurth, in Ziegenhain Kreis Ziegenhain geboren.

Vom Herbst 1944 bis Ostern 1949 besuchte ich in Ziegenhain die Volksschule und anschließend zwei Jahre lang das Realgymnasium in Treysa. Von Ostern 1951 bis 27.2.1958 war ich Schüler im neusprachlichen Zweig der Melanchthon-Schule im Steinatal, wo ich die Reifeprüfung bestand.

Nach Ableistung meiner verlängerten Grundwehrpflicht begann ich im Wintersemester 1959/60 mit dem Studium der Medizin an der Münchener Universität. Im anschließenden zweiten Semester studierte ich an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg, wo ich nach dem Sommersemester 1960 den ersten Teil der ärztlichen Vorprüfung ablegte. Mein weiteres Studium absolvierte ich in Marburg, nach dem Wintersemester 1961/62 legte ich dort den zweiten Teil der ärztlichen Vorprüfung ab. Nach sechs klinischen Semestern bestand ich am 25.3.1966 die ärztliche Prüfung.

Am 16.2.1963 heiratete ich meine Frau Antje, geb. Oehmig, wir haben inzwischen zwei Kinder.

Die experimentellen Arbeiten für die eingereichte Dissertation wurden in der Zeit vom Sommersemester 1963 bis Ende Wintersemester 1963/64 und vier Monate nach Beendigung des Medizinischen Staatsexamens durchgeführt.

Ich wohne mit meiner Familie in Bad Wildungen, wo ich am dortigen Stadtkrankenhaus als Medizinalassistent tätig bin.

Meine akademischen Lehrer waren die Herren Professoren und Dozenten in

Marburg: Beckmann, Berendes, Bickel, Braun-Falco, Bücher, Dorer, Eggstein, Exner, Förster, Franke, Gedigk, Gerok, Hamm, Hartmann, Hensel, Hildebrandt, Hornung, Huber, Jacob, Kunz, Lang, Linneweh, Lübbers, von Manger-König, Martini, Marx, Maurath, Neubauer, Niessing, Nieth, Oehme, Oehmig, Oschke, Overbeck, Petry, Petzoldt, Quecke, Rohen, Rosenthal, Sauer, Schlegel, Schleyer, Schmid, W., Schmidt, W., Schmitz, Schneider, Schölmerich, Schrappe, Schultheis, Schultze, Schwaiger, Siegert, Siess, Spiegelberg, Stein, Steuder, Straub, Streicher, Würterle,

München: Autrum, Bachmann, Fässler, v.Lanz, Wiberg

Würzburg: Fischer, Krause, Kulenkampff, Neubert, Roedig, Simonis.

